



ยโสธรเภสัชสาร

โรงพยาบาลโสธร



Dydrogesterone 10 mg

ฉบับที่ 2 / พ.ย.62



กลุ่มยา : Progestin

Generic name : Dydrogesterone

Brand name : Duphaston ®

ความแรง : 10 mg

บัญชียาหลักแห่งชาติ : เกด

กลไกการออกฤทธิ์

เป็น Active Progestogen เป็นสารป้องกัน การเพิ่มความเสี่ยงของ endometrium hyperplasia ไม่มีฤทธิ์แบบฮอร์โมนเอสโตรเจน ไม่มีฤทธิ์แบบฮอร์โมนเพศ

ข้อบ่งใช้

- ✓ ภาวะแท้งคุกคาม, ภาวะแท้งซ้ำซากและการมีบุตรยากจากภาวะ luteal insufficiency
- ✓ ภาวะขาดฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน ได้แก่ ปวดประจำเดือน เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ ภาวะขาดกระดูกฝ่อ วรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ ภาวะมีเลือดออกเนื่องจากมดลูกทำงานผิดปกติและอาการก่อนมีประจำเดือน
- ✓ Luteal support ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
- ✓ ต้านผลฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่ต้องการต่อเยื่อบุผนังมดลูกในหญิงวัยหมดระดูที่ได้รับการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนทดแทน



ขนาดยา

- ภาวะแท้งคุกคาม เริ่มต้นได้ตั้ง 40 mg ตามด้วย 10 mg ทุก 8 ชั่วโมงจนอาการบรรเทา
- ภาวะแท้งซ้ำซาก 10 mg วันละ 2 ครั้ง จนกระทั่งสัปดาห์ที่ 12 ของการตั้งครรภ์
- Dysmenorrhoea 10 mg วันละ 2 ครั้ง จากวันที่ 5-25 ของรอบเดือน
- Endometriosis 10 mg วันละ 2-3 ครั้ง จากวันที่ 5-25 ของรอบเดือน
- Dysfunctional bleeding : 20 หรือ 30 mg วันละครั้ง ให้ได้ตั้ง 10 วัน
- Regulate bleeding: 10 หรือ 20 mg วันละครั้ง ระหว่างครึ่งหลังของการมีประจำเดือน
- Secondary amenorrhoea 10 หรือ 20 mg วันละครั้ง 14 วัน ช่วงครึ่งหลังของประจำเดือน



ปฏิกิริยาระหว่างยา

เพิ่มการเมแทบอลิซึมยา Phenobarbital, Phenytoin, Rifampicin, Rifabutin, Nevirapine, Efavirenz สมุนไพส st. John's wort, เป๊ะก๊วย



อาการไม่พึงประสงค์

- พบได้บ่อย ปวดหัว คลื่นไส้ menstrual disorders (Dysmenorrhoea) เจ็บคัดตึงเต้านม
- พบไม่บ่อย เครียค วิงเวียน อาเจียน ตับทำงานผิดปกติ เกิดผื่นแพ้ (rash, pruritus, urticaria) น้ำหนักเพิ่ม