

แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล/หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโสธร		รหัส	วันที่เก็บเข้าฐานข้อมูล 11/08/2563		
ชื่อผู้ถาม ญ.พาลีตา กรชลกานต์					
ที่อยู่ โรงพยาบาลโสธร					
Tel: -			E-mail: -		
ประเภท	01 แพทย์ทั่วไป	02 แพทย์เฉพาะทาง	03 ทันตแพทย์	04 เภสัชกร	05 พยาบาล
	06 นักวิทย์	07 นักสาธารณสุข	08 นักศึกษา	09 ประชาชน	10 อื่น ๆ
วิธีถาม	01 วาจา	02 แบบขอรับบริการ	03 โทรศัพท์/โทรสาร	04 E-mail/Web	05 ไปรษณีย์
	06 อื่น ๆ ปลายลักษณะอักษร				
จุดประสงค์ของการถาม	01 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย		02 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		03 เพื่อเพิ่มเติมความรู้
	04 เพื่อการศึกษาวิจัย		05 อื่น ๆ เพื่อทำเป็นบทความและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล		
วันที่/เวลาที่ถาม 09/06/2563	ความรีบด่วน	01 ทันที	02 ภายใน 1 วัน	03 อื่นๆ ภายใน 1 สัปดาห์	
คำถาม: -ขอทราบข้อมูล Isoniazid และ Rifampicin ในหญิงให้นมบุตร					
ชื่อสามัญทางยา Prednisolone	กลุ่มยา			ชื่อการค้า	
หัวข้อสืบค้น (keywords) : Isoniazid, Rifampicin, pregnancy Lactation					
ประเภทคำถาม	01 Identification	02 Availability	03 Pharmacokinetics	04 Pregnancy / nursing	
	05 Interactions	06 Formulation	07 ADR/side effects	08 Toxicity / poisoning	
	09 Dosage / Administration	10 Therapeutic use / efficacy	11 Compatibility / Stability	12 Herbal / Conventional Medicine	
ข้อมูลผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	อายุ ปี	น้ำหนัก ___ กก.	ส่วนสูง ___ ซม.	
	ข้อมูลอื่น ๆ :				
วิธีสืบค้น	01 เอกสาร	02 คอมพิวเตอร์	03 แหล่งอื่น. โทรศัพท์มือถือ		
แหล่งข้อมูล	01 เอกสาร 1o	02 เอกสาร 2o	03 เอกสาร 3o	04 DIS Database	
	05 CD-ROM	06 Online	07 Drug file	08 อื่น ๆ	
<p>คำตอบ</p> <p>Isoniazid ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝ้าระวัง jaundice และ toxicity ปลายประสาทอักเสบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatible with breastfeeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enter breast milk/compatible <Drug information> <p>สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Isoniazid ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชัก ,อาการทางระบบประสาทส่วนปลาย (Nueropathy) และ ความเป้นพิษต่อตับ และควรแนะนำให้มารดาเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการขาดวิตามินบี 6 (Pyridoxine)</p> <p>Rifampicin ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝ้าระวัง jaundice และ toxicity</p>					

- Compatible with breastfeeding <WHO>
 - Compatible <AAP>
 - Enters breast milk/not recommended <Drug information>
 ยาขับออกทางน้ำนมได้ในปริมาณน้อย มารดาสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Rifampicin ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ดีซ่าน

เอกสารอ้างอิง

Drug Information Hand Book 26th edition 2017-2018

<http://www.safefetus.com/>

<http://www.rxcph.com/dis/pregnancy.htm>, ความปลอดภัยขณะใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์, 2550

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/hostpitalformurality/Chapter19_OK.pdf

<http://www.sk-hospital.com/~ob/teach/drugs&lactation.htm>, การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร
 งานพัฒนาบริการและเภสัชสนเทศ (DIS) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง

วิธีส่งคำตอบ	01 วาจา	02 ลายลักษณ์อักษร	03 โทรศัพท์ / โทรสาร	04 E-mail
	05 ไปรษณีย์	06 อื่น ๆ		
วันที่/เวลาที่ตอบกลับ 11/08/63			ระยะเวลาที่สืบค้น 30 นาที	
ผู้สืบค้น กนกวรรณ ศิริรัตนพันธ์				วันที่ 21/08/63