

แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล/หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโสธร		รหัส	วันที่เก็บเข้าฐานข้อมูล 07/05/2563		
ชื่อผู้ถาม ญญ.กขพร จันโอ , ICU Med1					
ที่อยู่ โรงพยาบาลโสธร					
Tel: -			E-mail: -		
ประเภท	01 แพทย์ทั่วไป	02 แพทย์เฉพาะทาง	03 ทันตแพทย์	04 เภสัชกร	05 พยาบาล
	06 นักวิทย์	07 นักสาธารณสุข	08 นักศึกษา	09 ประชาชน	10 อื่น ๆ
วิธีการถาม	01 วาจา	02 แบบขอรับบริการ	03 โทรศัพท์/โทรสาร	04 E-mail/Web	05 ไปรษณีย์
	06 อื่น ๆ ปลายลักษณะอักษร				
จุดประสงค์ของการถาม	01 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย		02 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		03 เพื่อเพิ่มเติมความรู้
	04 เพื่อการศึกษาวิจัย		05 อื่น ๆ เพื่อทำเป็นบทความและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล		
วันที่/เวลาที่ถาม 24/04/2563	ความรีบด่วน	01 ทันที	02 ภายใน 1 วัน	03 อื่นๆ ภายใน 1 สัปดาห์	
คำถาม: 1.ควรบริหารยา Trazocin ในผู้ป่วย จำกััด น้ำและ เกลือ เปิด Central line อย่างไร 2. Max conc. ของ Vancomycin เท่าใด					
ชื่อสามัญทางยา Piperacillin+Tazobactam inj. , Vancomycin inj.		กลุ่มยา		ชื่อการค้า	
หัวข้อสืบค้น (keywords) : Piperacillin+Tazobactam inj. IV Infusion Vancomycin inj. Max conc.					
ประเภทคำถาม	01 Identification	02 Availability	03 Pharmacokinetics	04 Pregnancy / nursing	
	05 Interactions	06 Formulation	07 ADR/side effects	08 Toxicity / poisoning	
	09 Dosage / Administration	10 Therapeutic use / efficacy	11 Compatibility / Stability	12 Herbal / Conventional Medicine	
ข้อมูลผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	อายุ ปี	น้ำหนัก ____ กก.	ส่วนสูง ____ ซม.	
	ข้อมูลอื่น ๆ :				
วิธีสืบค้น	01 เอกสาร	02 คอมพิวเตอร์	03 แหล่งอื่น. โทรศัพท์มือถือ		
แหล่งข้อมูล	01 เอกสาร 1o	02 เอกสาร 2o	03 เอกสาร 3o	04 DIS Database	
	05 CD-ROM	06 Online	07 Drug file	08 อื่น ๆ	
คำตอบ					
1.ควรบริหารยา Trazocin ในผู้ป่วย จำกััด น้ำและ เกลือ เปิด Central line อย่างไร -ละลายผงยา 4.5 กรัม ใน SW 20 ml -เจือจางด้วย D5W ให้ได้ปริมาตรอย่างน้อย 50 ml IV infusion 30 นาที -ห้ามให้พร้อมกันกับ Vancomycin เพราะจะทำให้ยาตกตะกอน					
2. Max conc. ของ Vancomycin เท่าใด -Max conc. 5 mg/1 ml ใช้ Vancomycin 500 mg + D5W 100 ml หรือ Vancomycin 1 g + D5W 200 ml IV drip มากกว่า 1 hr					
*หากได้รับยาในระยะเวลาที่สั้นกว่าหรือมีความเข้มข้นสูงกว่า มีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นความดันเลือดลดต่ำลง และเกิด thrombophlebitis					

*การบริหารที่รวดเร็วอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงและผื่นแดงที่คอและไหล่ (Red man syndrome)

-ห้ามให้พร้อมกันกับ Piperacillin+Tazobactam เพราะจะทำให้ยาตกตะกอน

เอกสารอ้างอิง

1. A.Trissel. Handbook on Injectable Drugs 12th ed. Bethesda. ASHP. 2011.
2. DATA FACT SHEET Vancomycin 500 mg injection,โรงพยาบาลลำปาง
3. การบริหารยาและความคงตัวของยาฉีด โรงพยาบาลศรีนครินทร์

วิธีส่งคำตอบ	01 วาจา	02 ลายลักษณ์อักษร	03 โทรศัพท์ / โทรสาร	04 E-mail
	05 ไปรษณีย์	06 อื่น ๆ		
วันที่/เวลาที่ตอบกลับ 07/05/63			ระยะเวลาที่สืบค้น 1 วัน	
ผู้สืบค้น กนกวรรณ ศิริรัตนพันธ์				วันที่ 07/05/63