

แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาล/หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโสธร		รหัส	วันที่เก็บเข้าฐานข้อมูล 09/06/2563		
ชื่อผู้ถาม ญญ.วิภาวดี ภูศรีฐาน , ทันตแพทย์					
ที่อยู่ โรงพยาบาลโสธร					
Tel: -			E-mail: -		
ประเภท	01 แพทย์ทั่วไป	02 แพทย์เฉพาะทาง	03 ทันตแพทย์	04 เภสัชกร	05 พยาบาล
	06 นักวิทย์	07 นักสาธารณสุข	08 นักศึกษา	09 ประชาชน	10 อื่น ๆ
วิธีถาม	01 วาจา	02 แบบขอรับบริการ	03 โทรศัพท์/โทรสาร	04 E-mail/Web	05 ไปรษณีย์
	06 อื่น ๆ ปลายลักษณะอักษร				
จุดประสงค์ของการถาม	01 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย		02 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		03 เพื่อเพิ่มเติมความรู้
	04 เพื่อการศึกษาวิจัย		05 อื่น ๆ เพื่อทำเป็นบทความและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล		
วันที่/เวลาที่ถาม 09/06/2563	ความรีบด่วน	01 ทันที	02 ภายใน 1 วัน	03 อื่นๆ ภายใน 1 สัปดาห์	
คำถาม: ผู้ป่วยกลืน 0.2% Povidone iodine mouthwash					
ชื่อสามัญทางยา Piperacillin+Tazobactam inj. , Vancomycin inj.		กลุ่มยา		ชื่อการค้า	
หัวข้อสืบค้น (keywords) : 0.2% Povidone iodine mouthwash					
ประเภทคำถาม	01 Identification	02 Availability	03 Pharmacokinetics	04 Pregnancy / nursing	
	05 Interactions	06 Formulation	07 ADR/side effects	08 Toxicity / poisoning	
	09 Dosage / Administration	10 Therapeutic use / efficacy	11 Compatibility / Stability	12 Herbal / Conventional Medicine	
ข้อมูลผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	อายุ ปี	น้ำหนัก ____ กก.	ส่วนสูง ____ ซม.	
	ข้อมูลอื่น ๆ :				
วิธีสืบค้น	01 เอกสาร	02 คอมพิวเตอร์	03 แหล่งอื่น. โทรศัพท์มือถือ		
แหล่งข้อมูล	01 เอกสาร 1o	02 เอกสาร 2o	03 เอกสาร 3o	04 DIS Database	
	05 CD-ROM	06 Online	07 Drug file	08 อื่น ๆ	
<b>คำตอบ</b>					
<p><b>แนวทางปฏิบัติการให้การรักษาทางทันตกรรม</b> เพื่อป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ผู้ป่วย บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก 0.2% povidone iodine โดยให้อมกลั้วในช่องปาก 1 นาที แล้วบ้วนทิ้ง โดยมีข้อห้ามใช้ ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ผู้ที่มีประวัติการแพ้ไอโอดีน ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ป่วยใน ระยะให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี</p> <p><b>ข้อควรระวัง</b> คืออาจเกิดการระคายเคือง การกลืนกินสามารถทำให้ปวดท้อง, อาเจียน, ท้องร่วงและแผลไหม้ของ ทางเดินอาหาร</p> <p>หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปมีความเสี่ยงต่อความเป็นพิษของไอโอดีน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะไตวายการเปลี่ยนแปลง ของระดับความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์หรืออวัยวะล้มเหลวอื่น ๆ ความเป็นพิษมักพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อโพวิโดน-</p>					

ไอโอดีน เฉพาะที่ถูกใช้อย่างเรื้อรังและในปริมาณมาก

มีตัวอย่างรายงาน ว่ามีผู้ป่วยกลืน 10 % Povidone iodine มีอาการระคายเคืองที่ลำคอ และ คลื่นไส้ อาเจียน หลายครั้ง  
จนมีอาการดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. กรมการแพทย์,แนวทางปฏิบัติการให้การรักษาทางทันตกรรม 30 มีนาคม 2563
2. <https://www.poison.org/articles/povidone-iodine-safe-use-of-a-common-antiseptic-193>

วิธีส่งคำตอบ	01 วาจา	02 ลายลักษณ์อักษร	03 โทรศัพท์ / โทรสาร	04 E-mail
	05 ไปรษณีย์	06 อื่น ๆ		
วันที่/เวลาที่ตอบกลับ 09/06/63			ระยะเวลาที่สืบค้น 20 นาที	
ผู้สืบค้น กนกวรรณ ศิริรัตนพันธ์				วันที่ 09/06/63