

แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| โรงพยาบาล/หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโสธร | | รหัส | วันที่เก็บเข้าฐานข้อมูล 24/07/2563 | | |
| ชื่อผู้ถาม ญ.อรอุมา บัวเบิก | | | | | |
| ที่อยู่ โรงพยาบาลโสธร | | | | | |
| Tel: - | | | E-mail: - | | |
| ประเภท | 01 แพทย์ทั่วไป | 02 แพทย์เฉพาะทาง | 03 ทันตแพทย์ | 04 เภสัชกร | 05 พยาบาล |
| | 06 นักวิทย์ | 07 นักสาธารณสุข | 08 นักศึกษา | 09 ประชาชน | 10 อื่น ๆ |
| วิธืถาม | 01 วาจา | 02 แบบขอรับบริการ | 03 โทรศัพท์/โทรสาร | 04 E-mail/Web | 05 ไปรษณีย์ |
| | 06 อื่น ๆ ปลายลักษณะอักษร | | | | |
| จุดประสงค์ของการถาม | 01 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย | | 02 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | | 03 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ |
| | 04 เพื่อการศึกษาวิจัย | | 05 อื่น ๆ เพื่อทำเป็นบทความและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล | | |
| วันที่/เวลาที่ถาม 24/04/2563 | ความรีบด่วน | 01 ทันที | 02 ภายใน 1 วัน | 03 อื่นๆ ภายใน 1 สัปดาห์ | |
| คำถาม: 1.หญิงตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ สามารถใช้ Daflon และ Proctosedyl suppo ได้หรือไม่ | | | | | |
| ชื่อสามัญทางยา | กลุ่มยา | | ชื่อการค้า Daflon และ Proctosedyl suppo | | |
| หัวข้อสืบค้น (keywords) : Piperacillin+Tazobactam inj. IV Infusion Vancomycin inj. Max conc. | | | | | |
| ประเภทคำถาม | 01 Identification | 02 Availability | 03 Pharmacokinetics | 04 Pregnancy / nursing | |
| | 05 Interactions | 06 Formulation | 07 ADR/side effects | 08 Toxicity / poisoning | |
| | 09 Dosage / Administration | 10 Therapeutic use / efficacy | 11 Compatibility / Stability | 12 Herbal / Conventional Medicine | |
| ข้อมูลผู้ป่วย | <input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F | อายุ ปี | น้ำหนัก ____ กก. | ส่วนสูง ____ ซม. | |
| | ข้อมูลอื่น ๆ : | | | | |
| วิธีสืบค้น | 01 เอกสาร | 02 คอมพิวเตอร์ | 03 แหล่งอื่น. โทรศัพท์มือถือ | | |
| แหล่งข้อมูล | 01 เอกสาร 1o | 02 เอกสาร 2o | 03 เอกสาร 3o | 04 DIS Database | |
| | 05 CD-ROM | 06 Online | 07 Drug file | 08 อื่น ๆ | |
| คำตอบ Daflon ไม่พบวายามีผลต่อน้ำหนักตัวหรือพัฒนาการของทารก แต่ด้วยข้อมูลที่จำกัด และขาดผล การศึกษาการใช้ในระยะต้นของการตั้งครรภ์ จึงให้ใช้ Daflon (Diosmin + Hesperidin) ได้ ในขณะที่ตั้งครรภ์ไตรมาส 2 และ 3 Proctosedyl suppo มีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ขณะตั้งครรภ์เนื่องจากยานี้มีส่วนผสม ของสเตียรอยด์อยู่ด้วย จึงให้ใช้ Proctosedyl suppo. ในขณะที่ตั้งครรภ์ได้แต่ไม่ควรใช้ ปริมาณมากและไม่ใช้ต่อเนื่องกันนานเกิน 7 วัน | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|
| เอกสารอ้างอิง | | | |
| 1. Drug Information Hand Book 12th edition 2005-2006 | | | |
| 2. http://www.safefetus.com/ http://www.rxcph.com/dis/pregnancy.htm , ความปลอดภัยขณะใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์, 2550 | | | |
| 3. http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/hostpitalformuraly/Chapter19_OK.pdf | | | |
| 4. http://www.sk-hospital.com/~ob/teach/drugs&lactation.htm , การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร | | | |
| วิธีส่งคำตอบ | 01 วาจา | 02 ลายลักษณ์อักษร | 03 โทรศัพท์ / โทรสาร |
| | 05 ไปรษณีย์ | 06 อื่น ๆ | |
| วันที่/เวลาที่ตอบกลับ 24/07/63 | | ระยะเวลาที่สืบค้น 1 วัน | |
| ผู้สืบค้น กนกวรรณ ศิริรัตนพันธ์ | | วันที่ 24/07/63 | |