

**แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา**  
**Amiodarone injection(Cordarone) 150 mg/3ml**  
**( 50 mg/ml )**

ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 หอผู้ป่วย.....ว/ด/ป.....  
 HN..... AN.....

**ข้อควรระวังในการบริหารยา**

**การผสมยา:**

- IV infusion ควรผสมใน D5W เท่านั้น , ความเข้มข้นสูงสุด 6 mg/ml
- ความคงตัวหลังผสม 24 ชม.ในภาชนะบรรจุที่เป็น แก้ว หรือ polyolefin ห้ามเติมตัวยาอื่นใดลงไปผสมกับยานี้

**การบริหารยา:**

- IV infusion ควรใช้ infusion pump และหากใช้ความเข้มข้น >2 mg/ml ควรให้ยาทาง central line
  - IV push slowly (ใช้เฉพาะกรณีจำเป็น) : 150 mg in D5W 100 ml ควรฉีดช้าๆ ≥ 10 นาที
  - กรณี CPR ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้  
ผู้ใหญ่ : Initial dose 5 mg/kg/dose (max.300 mg/dose) ผสมใน D5W 20-30 ml ฉีด IV push 3-5 นาที หากยังมีอาการให้ซ้ำ 150 mg หรือ 2.5 mg/kg ขนาดยารวมสูงสุดไม่เกิน 2.2 g/24 hrs (ขนาดยา > 2.1g/24 hrs เพิ่มความเสี่ยง hypotension )  
เด็ก : Initial dose 5 mg/kg IV/IO (max.300 mg/dose) อาจให้ซ้ำได้อีก 2 ครั้ง ( รวมสูงสุดไม่เกิน 15 mg/kg)
  - หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่การทำงานของ thyroid ผิดปกติ, หญิงตั้งครรภ์ (ยกเว้นกรณีที่เป็น CPR)
  - ยาที่มีปฏิกริยาต่อ amiodarone จำเป็นต้องแจ้งแพทย์ทันทีเมื่อมีการสั่งใช้ยา ร่วมกัน หรือมีการปรับเปลี่ยนขนาดยา ได้แก่ digoxin(เพิ่มระดับ serum digoxin เพิ่มความเป็นพิษ), Phenytoin (ระดับ phenytoin เพิ่มขึ้น /ระดับ Amiodarone ลดลง),Warfarin(เพิ่มฤทธิ์ warfarin),ยาในกลุ่มQuinolone(เกิด torsades de pointes หรือ ทำให้ QT prolong), Fentanyl(เกิด bradycardia hypotension sinus arrest), Ritronavirและยาในกลุ่ม Protease inhibitor เพิ่มฤทธิ์ amiodarone
- หากได้รับยาเกินขนาด:** แก้ไขตามอาการที่เกิดขึ้น ไม่สามารถขจัดออกโดยการฟอกเลือดได้

**การติดตามการให้ยาผู้ป่วยสำหรับยาฉีด (ตลอดระยะเวลาที่ให้ยา และ หลังหยุดยาไปแล้ว 24 ชั่วโมง)**

วันที่ติดตาม												
บันทึกทุก 15-30 นาที ใน 1 ชม.แรกและต่อไปทุก 4 ชม. รายงานแพทย์เมื่อ(หรือตามแพทย์สั่ง)												
● BP <90/60mmHg												
● ผู้ใหญ่: HR<60 ครั้ง/นาที												
● เด็กอายุ <1 ปี: HR<120 ครั้ง/นาที												
● เด็กอายุ 1-10 ปี: HR <80 ครั้ง/นาที												
● เด็กอายุ >10 ปี: HR <60 ครั้ง/นาที												
● EKG พบ VT,VF,Heart block,Prolonged QT												
● ตรวจสอบ IV site ทุก 1-2 ชม.ขณะ drip ยา(ปวด/ไม่ปวด)												
(ลงชื่อ)												

หมายเหตุ :ให้ระบุค่าที่วัดได้ หากสัญญาณชีพผิดปกติให้ วงกลม เพื่อรายงานแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์ : ( ชักตามอาการ หากผู้ป่วยสื่อสารได้ )

- เติมน้ำ มึนงง ชาบริเวณนิ้วและเท้า แขน/ขา อ่อนแรง ร้อนวูบวาบ เหงื่อออก