

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา

Dobutamine injection :250 mg/5ml/vial

(50 mg/ml)

ชื่อ.....อายุ.....ปี

หอผู้ป่วย.....ว/ด/ป.....

HN.....AN.....

ข้อควรระวังในการบริหารยา

การผสมยา

- สามารถผสมได้กับ : D5W, D5N/2, D5S, NSS, RLS
- ความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 5 mg/ml
- ห้ามผสมกับสารละลายต่าง เช่น Sodium bicarbonate
- ยามผสมแล้วใช้ภายใน 24 ชั่วโมง สารละลายอาจเกิดสีชมพูแต่ไม่มีผลต่อความแรงของยาแต่หากเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือมีการตกตะกอนไม่ควรใช้

การบริหาร

- ขนาดยาสูงสุดในการให้ยาไม่เกิน 40 mcg/kg/min
- ควรให้ IV infusion ผ่าน infusion pump ควรให้ทางเส้นเลือดดำใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิด extravasation
- ควรปรับขนาดอย่างช้าๆ ไม่ควรหยุดยาทันที เพราะอาจมีผลต่อความดันโลหิตอย่างทันทีทันใด (hypotension)

การติดตามการให้ยาผู้ป่วย (หรือตามแพทย์สั่ง)

วันที่													
บันทึกเวลา 15 นาทีหลังให้ยาและทุกครั้งที่มีการปรับขนาดยา หลังจากนั้นทุก 1 ชม. รายงานแพทย์เมื่อ													
• ผู้ใหญ่ BP>160/90 mmHg													
• ผู้ใหญ่ HR >120 ครั้ง/นาที													
• เด็ก < 1ปี HR > 160 ครั้ง/นาที													
• เด็ก 1-10 ปี HR > 120 ครั้ง/นาที													
• เด็ก >10 ปี HR >100 ครั้ง/นาที													
เวลา (ทุก 1-2 ชม.)													
• Urine Output < 25 cc/hr or 100 cc/4 hr													
• Extravasation (พบ/ไม่พบ)													
• EKG monitor กรณีเกิด tachycardia													
(ลงชื่อ)													

หมายเหตุ:ให้ระบุค่าที่วัดได้ หากสัญญาณชีพผิดปกติให้ วงกลม เพื่อรายงานแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์ (ชักถามอาการ หากผู้ป่วยสื่อสารได้)

วันที่												
	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก
เวลา												
• ผิวซัด เย็น หรือเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว												
• คลื่นไส้ อาเจียน												
• ปวดศีรษะ												
• เจ็บแน่นหน้าอก												
• หายใจลำบาก/เหนื่อยหอบ												
(ลงชื่อ)												

หมายเหตุ:ทำเครื่องหมาย/กรณีมีอาการไม่พึงประสงค์; x เมื่อไม่มีอาการไม่พึงประสงค์; - หากผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้