

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา

DoPAmine injection

ความแรง: 250 mg/10ml/amp

ชื่อ.....อายุ.....ปี

หอผู้ป่วย.....ว/ด/ป.....

HN..... AN.....

ข้อควรระวังในการบริหารยา

การผสมยา

- ผสมได้ใน D5W, NSS, D5S, D5N/2, LRS ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml
- ห้ามผสมกับสารละลายต่าง ได้แก่ Sodium bicarbonate (7.5% NaHCO₃) , chloride (เช่น KCl) และ Irons salts
- ยาผสมแล้วใช้ภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาถ้าเกิดเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนๆเป็นสีเข้มขึ้น หรือสีน้ำตาล

การบริหารยา

- ห้ามให้ IV โดยตรง โดยไม่เจือจาง ควรให้ IV infusion ผ่าน infusion pump และบริหารผ่านเส้นเลือดดำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการเกิด Extravasations
- ให้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง เริ่มจาก 1-5 mcg/kg/min อัตราเร็วสูงสุดในการให้ยา 50 mcg/kg/min
- ควรปรับขนาดอย่างช้าๆ เพราะหากหยุดทันทีอาจเกิด hypotension
- Druginteraction (sig 1): Phenytoin rapid onset (BP หรือ bradycardia)

การติดตามการให้ยาผู้ป่วย (หรือตามแพทย์สั่ง)

วันที่														
บันทึกเวลา 15 นาทีหลังให้ยาและทุกครั้งที่มีการปรับขนาดยา หลังจากนั้นทุก 1 ชม.														
รายงานแพทย์เมื่อ														
● ผู้ใหญ่ BP > 160/90 mmHg														
● ผู้ใหญ่ HR > 120 ครั้ง/นาที														
● เด็ก < 1 ปี HR > 160 ครั้ง/นาที														
● เด็ก 1-10 ปี HR > 120 ครั้ง/นาที														
● เด็ก > 10 ปี HR > 100 ครั้ง/นาที														
เวลา (ทุก 1-2 ชม.)														
● Urine Output < 25 cc/hr or 100 cc/4 hr														
● Extravasation (พบ/ไม่พบ)														
● EKG monitor กรณีเกิด tachycardia														
(ลงชื่อ)														

หมายเหตุ: ให้ระบุค่าที่วัดได้ หากสัญญาณชีพผิดปกติให้ วงกลม เพื่อรายงานแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์(ชักถามอาการ หากผู้ป่วยสื่อสารได้)

วันที่												
	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก	เช้า	บ่าย	ดึก
เวลา												
● คลื่นไส้ อาเจียน												
● ปวดศีรษะ												
● เจ็บหน้าอก												
● หายใจลำบาก/เหนื่อยหอบ												
● ผิวซิด เย็น หรือเขียวปลายมือปลายเท้าเขียว												
(ลงชื่อ)												

หมายเหตุ: ทำเครื่องหมายกรณีมีอาการไม่พึงประสงค์; x เมื่อไม่มีอาการไม่พึงประสงค์; - หากผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้