

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา
Streptokinase Injection: 1,500,000 unit/vial

ชื่อ.....อายุ.....ปี
 หอผู้ป่วย.....ว/ด/ป.....
 HN..... AN.....

ข้อควรระวังในการบริหารยา

การผสมยา :

- ละลายยาด้วย NSS หรือ D5W 5 ml ค่อยๆฉีดให้ไหลลงข้างๆขวด แล้วค่อยๆหมุนขวดไปมาจนยาละลายหมด ระวังอย่าให้เกิดฟอง
- ฉีดตัวยาคือผสมแล้วใน NSS หรือ D5W 100 ml ระวังอย่าให้เกิดฟอง
- หลังจากเจือจางยา สามารถเก็บได้นาน 24 ชั่วโมงในตู้เย็นและ 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส

การบริหารยา:

- ใช้ infusion pump ให้ยาในเวลา 60 นาที (rate 100 ml/hr)
- เมื่อ drip ยาหมด D5W หรือ NSS ประมาณ 20 ml drip ต่อจนหมด เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายเข้าหลอดเลือดดำ

ข้อควรระวัง : รายงานแพทย์เมื่อ พบว่าผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ยา(ก่อนเริ่มให้ยา),พบการสั่งใช้ยาที่เกิด drug interaction,การให้ยาในช่วงแรกแล้วพบอาการแพ้ยา,มีอาการหืด (asthmatic symptom),พบภาวะเลือดออกผิดปกติ(bleeding)

การติดตามการให้ยาผู้ป่วยสำหรับยาฉีด

วันที่/เวลา										
● HR ทุก 5 นาที × 6 ครั้ง , ทุก 15 นาที จนยาหมด then ทุก 30 นาที × 2 ครั้ง ,ทุก 1 ชม. × 2 ครั้ง ,ทุก 2 ชม. จนครบ 24 ชม. (Keep HR 60-100 ครั้ง/นาที)										
● BP ทุก 5 นาที × 6 ครั้ง,ทุก 15 นาที จนยาหมด then ทุก 30 นาที × 2 ครั้ง, ทุก 1 ชม. × 2 ครั้ง then ทุก 2 ชม. จนครบ 24 ชม. (รายงานแพทย์เมื่อ BP < 90/60 mmHg)										
● EKG complete leads (12 lead) หลังได้รับยา นาทีที่ 30,60,90,120 (รายงานแพทย์เมื่อมี arrhythmia)										
● Neuro sign ทุก 2 ชั่วโมง										
เวลา (ตามแพทย์สั่ง)										
● ตรวจ PT, PTT, INR กรณีมีประวัติเสี่ยงต่อ bleeding disorder										
● ติดตามภาวะเลือดออกผิดปกติ										
● สังเกตอาการแพ้ยา (ช่วงแรกของการให้ยา)										
(ลงชื่อ)										

หมายเหตุ :ให้ระบุค่าที่วัดได้ หากสัญญาณชีพผิดปกติให้ วงกลม เพื่อรายงานแพทย์