

ข้อแนะนำในการใช้ยา


- ควรเหน็บยาติดต่อกันทุกวันอย่างน้อยตามจำนวนวันหรือขนาดยาที่กำหนดเช่น 7 วัน หรือขึ้นกับชนิดของยา และตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หากรู้สึกอยากปัสสาวะ ให้ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเริ่มใช้ยา
- เมื่อสอดยาเหน็บแล้วควรนอนท่าเดิมนิ่ง ๆ จนกว่ายาจะละลายหมด ปกติมักจะให้เหน็บยาก่อนนอน
- ควรใช้กระดาษชำระซ้อนทับกันหลาย ๆ ชั้นรองที่กางเกงในไว้ เพื่อรองรับส่วนของเม็ดยาที่จะละลายไหลออกมา

ยาเหน็บช่องคลอด




1

ล้างมือให้สะอาด



แกะห่อยาออก แล้วจุ่มเม็ดยาในน้ำ
สะอาดเพียง 1-2 วินาทีพอให้ยาชื้น

2


1-2 วินาที

3

นอนหงาย หรือนั่งเอนตัวไปด้านหลัง
ชันหัวเข้าขึ้นและแยกขาออก



สอดยาเข้าช่องคลอด โดยให้ด้านที่มัน
หรือเรียกว่าเข้าไปก่อน ใช้นิ้วช่วยดันยา

4**5**

นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที