

ข้อแนะนำในการใช้ยา


- ไม่ควรเคี้ยวยา กลืนยา หรือกลืนน้ำลายขณะที่อมยา
- ห้ามใช้ยาอมใต้ลิ้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังใช้ยา sildenafil หรือ vardenafil และภายใน 48 ชั่วโมงหลังใช้ยา tadalafil

ยาอมใต้ลิ้นบรรเทาอาการ
เจ็บเค้นอกจากภาวะหัวใจขาดเลือด




1

เมื่อผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือด
เกิดอาการเจ็บเค้น หรือปวด แน่นหน้าอก
ให้หยุดกิจกรรมที่ทำอยู่และนั่งหรือนอนลง




2

อมยาหนึ่งเม็ดไว้ใต้ลิ้น ปล่อยให้ละลายจนหมด ห้ามเคี้ยว
หรือกลืนยา ห้ามดื่มเครื่องดื่ม
หรืออาหารใดๆ และกลืน
น้ำลายให้น้อยที่สุด



3

- อาการจะดีขึ้นหลังจากอมยาไป 5 นาที
- ถ้าไม่ดีขึ้นให้ออมยาเม็ดที่ 2
- หลังจากนั้น 5 นาที อาการไม่ดีขึ้น ให้ออมยาเม็ดที่ 3 พร้อมนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โดยรวมไม่เกิน 3 เม็ด



ในการใช้ยานี้เพื่อป้องกันอาการกำเริบ
ให้ออมยานี้ก่อนเริ่มกิจกรรมที่คาดว่าจะทำ
ให้มีอาการกำเริบ อย่างน้อย 5 – 10 นาที
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ 2

4