

ยโสธรเภสัชสาร โรงพยาบาลยโสธร



วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ฉบับที่ 25/ 2566

แนวทางการให้บริการวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน
ของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ข้อบ่งชี้



- มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องคลอดและมะเร็งทวารหนักที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปิลโลมา สายพันธุ์ 16 และ 18
- หูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และป้องกันการติดเชื้อและภาวะก่อนมะเร็ง (precancerous) หรือภาวะเซลล์ผิดปกติชนิด dysplasia ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปิลโลมา สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18



กรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2566



ตัวอย่างวัคซีน



วิธีการฉีด

- แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ IM บริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ (deltoid) (ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือด IV โดยเด็ดขาด**)
- แนะนำให้ หญิง อายุ 11 – 20 ปี ให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีน HPV ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

ข้อควรระวัง

- อาการเป็นลม อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในวัยรุ่น อาการเป็นลมซึ่งบางครั้งทำให้เกิดการหกล้มเกิดขึ้นได้ภายหลังการฉีดวัคซีน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนควรได้รับการสังเกตประมาณ 15 นาทีหลังได้รับวัคซีน
- การตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือเลื่อนออกไปก่อน ผู้ที่กำลังมีไข้หรือมีไข้เร็วๆนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสาเหตุการเกิด ในผู้ที่มีไข้ต่ำและมีการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบนไม่รุนแรง ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
- ควรระมัดระวัง ในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือ มีปัญหาในระบบแข็งตัวของเลือด เนื่องจากอาจมีภาวะเลือดออกภายหลังการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ข้อห้ามใช้

- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบในวัคซีน
- ผู้ที่เคยมีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว **ไม่ควรได้รับการฉีดอีก**
- ผู้ที่รับประทานยา **Aspirin และ Warfarin ควรแจ้งแพทย์ก่อนฉีด**

การศึกษาทางคลินิกในมนุษย์ ยังไม่มีข้อมูลที่รัดกุมเพียงพอ จากการศึกษาการใช้วัคซีนนี้ในสตรีตั้งครรภ์ **จึงควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์**

สตรีมีครรภ์

สตรีที่มีโอกาสตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีน