



ยโสธรเภสัชสาร โรงพยาบาลโสธร



ฉบับที่ 1/2567

การพัฒนาระบบการป้องกันแพ้ยาซ้ำ: Safety steps

Safety steps


ป้องกันแพ้ยาซ้ำ



กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโสธร (อัปเดต 31/2567)

สืบเนื่องจากการประชุม MM Conference (PCT med) เรื่อง ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมามีข้อสรุปแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ คือ **Safety steps** จากแนวทางเดิม 7 Safety steps ดังนี้

**สอบถามทันที ดูที่ประวัติเดิม
แกะไขเมื่อแพ้เพิ่ม คอนเฟิร์มแล้วบอกต่อ**



“ป้ายเตือนแพ้ยาที่เตียงผู้ป่วย”

ปีงบ 2567 พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ 2 ราย จึงได้ RCA ร่วมกับแพทย์และพยาบาล ได้ข้อสรุปว่า พยาบาลจะติดป้ายเตือนแพ้ยาที่เตียงผู้ป่วยแล้วป้ายเตือนนั้นจะมีช่องสำหรับใส่ Lab alert ที่มีประวัติยาที่ผู้ป่วยแพ้ ดังนั้น ผู้ป่วยใน ที่มีประวัติแพ้ยา ห้องยาผู้ป่วยใน จะปรับใบ Lab Alert เย็บติดหน้าซองยาไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้พยาบาลนำไปใส่ในป้ายเตือนแพ้ยาคะ ดังตัวอย่าง



YA yaso



Line Official Account

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเอกสารได้ที่ งานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 095-605-9634