



ยไฮดรอกortiซอล โรงพยาบาลยโสธร



Clobetasol 0.5mg (0.05 % w/w) Lotion

ฉบับที่ 221/2566

บัญชียาหลักแห่งชาติ : ED ง

เงื่อนไข : ใช้สำหรับโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น

กลุ่มยา : Anti-infective skin preparations ;

Topical corticosteroids

รูปแบบยา : Lotion

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาระยะสั้นสำหรับโรคผิวหนังอักเสบและคันชนิดไม่ติดเชื้อ ความรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก เช่น โรคผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มผื่นแดงและคันเนื่องจากการแพ้ โรคผิวหนังอักเสบเนื่องจากต่อมไขมันอักเสบ โรคสะเก็ดเงินบางชนิด ซึ่งตอบสนองต่อคอร์ติโคสเตียรอยด์

เภสัชจลนศาสตร์

Absorption: ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นผิวหนังตามบริเวณที่ทายา อุณหภูมิ ความชุ่มชื้นของผิวหนัง และอายุ (อายุน้อยดูดซึมได้ดีกว่า)

Excretion: น้ำดี ปัสสาวะ

ข้อควรระวังในหญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร

หญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

หญิงให้นมบุตร

ไม่ควรทายาบริเวณหัวนมและเต้านมก่อนให้นมบุตร

อาการไม่พึงประสงค์

Common: 1% to 10%:

·burning, stinging, itching, redness, irritation and dry skin

·thinning of the skin

·widening of small blood vessels in the skin

skin discomfort at the site of application

กลไกการออกฤทธิ์

เป็นยากลุ่ม corticosteroids ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเฉพาะบนผิวหนังชั้น Dermal และ Epidermal โดยมีกลไกยับยั้ง Mediator ของกระบวนการสร้าง Arachidonic acid ในเซลล์ ทำให้การสังเคราะห์ DNA ภายในเซลล์ลดลง ส่งผลให้ลดการสะสมของเม็ดเลือดขาวในบริเวณนั้น

ขนาดยา

ผู้ใหญ่: ใช้ยาความเข้มข้น 0.5 mg (0.05% w/w) ทาลงเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง หากจำเป็น สามารถลดปริมาณลงได้

-ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 45 กรัม/สัปดาห์

-ระยะเวลาในการรักษาสูงสุดไม่เกิน 3 สัปดาห์

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ใช้ยาดังด้วยความระมัดระวัง

จลาจยา

ชื่อยา โคลเมทาซอลโพรพิโอเนต 0.05% ชนิดโลชั่น ทาภายนอก

ทาลงเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง

ยากาสำหรับโรคผิวหนังอักเสบระดับปานกลางถึงรุนแรง

เอกสารอ้างอิง

1 เอกสารกำกับยา

2 Clobetasol propionate Lotion, Drug.com. [Internet]. 2023 [cited 2023 Nov 15].

http://www.ppkhosp.go.th/ppkjournal/fulltext.asp?Htmlfile=Fulltext/2556/30_4_8.html&sysid=743