



# ยโสรเรเกิ้ลซสาร

## โรงพยาบาลโสร



### Ursodeoxycholic 250 mg

บัญชียาหลักแห่งชาติ : ED ง  
กลุ่มยา : Drugs affecting intestinal secretions  
รูปแบบยา : capsule

#### ข้อบ่งใช้

- ใช้สำหรับ cholestatic liver disease

#### เภสัชจลนศาสตร์


- Absorption: 90%
- Protein binding: ~70%
- Metabolism: Undergoes extensive enterohepatic recycling; following hepatic conjugation and biliary secretion, the drug is hydrolyzed to active ursodiol, where it is recycled or transformed to lithocholic acid by colonic microbial flora; during chronic administration, ursodiol becomes a major biliary and plasma bile acid constituting 30% to 50% of biliary and plasma bile acids
- Excretion: Feces; urine (<1%)

#### ข้อควรระวังในหญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร

**หญิงตั้งครรภ์** ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและข้อมูลการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์มีจำกัด จึงไม่แนะนำให้ใช้  
**หญิงให้นมบุตร** ยาสามารถผ่านออกทางน้ำนมได้เล็กน้อยและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ในการก

#### อาการไม่พึงประสงค์

**พบบ่อย >10%:**  
Gastrointestinal: Constipation (10%-26%), diarrhea (1%-27%), dyspepsia (3%-17%), nausea (5%-17%)  
Nervous system: Dizziness (17%), headache (25%)  
Neuromuscular & skeletal: Back pain (12%)  
Respiratory: Upper respiratory tract infection (12%-16%)



ฉบับที่ 3/1/2566

#### กลไกการออกฤทธิ์

ช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในน้ำดีและนิ้วในน้ำดีโดยลดการหลั่งโคเลสเตอรอลจากตับและการดูดซึมโคเลสเตอรอลบางส่วนกลับทางลำไส้ กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนกรดน้ำดีที่เป็นพิษต่อตับให้อยู่ในรูปละลายน้ำได้ดีขึ้น ละลายก้อนนิ้วน้ำดีในผู้ที่ถุงน้ำดีทำงานปกติ และช่วยระบายน้ำดีจากตับและถุงน้ำดี

#### ขนาดยา

**Adult Gallstone dissolution:** 8-10 mg/kg daily given in 2 or 3 divided doses.  
**Gallstone prevention:** 600 mg daily (300 mg bid).  
**Primary biliary cirrhosis:** 10-15 mg/kg daily in 2-4 divided doses.

#### ฉลากยา

ชื่อยา เออร์โซดีอ็อกซีโคลิก 250 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล  
รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง  
Preg cat. X  
ยาละลายนิ้วในถุงน้ำดีป้องกันภาวะตับแข็งจากท่อน้ำดีอุดตัน  
\*\*ห้ามเคี้ยว รับประทานพร้อมอาหาร 1,2 หรือ อาจให้วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน  
\*\*หากต้องการยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียม ให้รับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

1.Medscape. Rosuvastatin: Drug information [Internet]. 2022 [cited 2022, June 21]. Medscape WebmedMD Inc. Available from: <https://reference.medscape.com/drug/crestor-ezallor-sprinkle-rosuvastatin-342467>

2.Lexicomp. Rosuvastatin: Drug information [Internet]. 2022 [cited 2023, June 20]. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Available from: [www.uptodate.com/contents/rosuvastatin-drug-information](http://www.uptodate.com/contents/rosuvastatin-drug-information)