



ยโลธรเภสัชสาร

โรงพยาบาลโลธร



Edoxaban 60 mg tablet

บัญชียาหลักแห่งชาติ : NED 4

กลุ่มยา : Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants

รูปแบบยา : Tablet



ข้อบ่งใช้

- ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ
- ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปอด แขน ขา
- ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก หรือข้อเข่า

อันตรกิริยาระหว่างยา

ยาที่ **"เพิ่ม"** ฤทธิ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ NOAC ได้แก่

- ยาฆ่าเชื้อ เช่น Clarithromycin, Ketoconazole, Itraconazole, Ritonavir

ยาที่ **"ลด"** ฤทธิ์ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ NOAC ได้แก่

- ยากันชัก เช่น Carbamazepine, Phenytoin
- ยาฆ่าเชื้อ เช่น Rifampicin

ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (NOACS)

1. ต้องกินยาอย่างเคร่งครัด และตรงเวลา เนื่องจากการขาดยาหรือกินไม่ตรงเวลา สามารถเพิ่มทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
2. ระหว่างกินยา ต้องสังเกตอาการผิดปกติดังนี้
 - 2.1 อาการเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกตามไรฟัน รอยจ้ำเขียวตามร่างกาย เลือดกำเดาไหล ประจำเดือนออกมากผิดปกติ หรือเลือดออกในสมอง อาจมีอาการปวดศีรษะรุนแรง เดินเซ อาเจียน ชัก ซึม หมดสติ
 - 2.2 อาการลิ่มเลือดอุดตัน เช่น อาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไม่ออก พูดไม่ชัด หรือมองเห็นภาพซ้อน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3. ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการเกิดบาดแผล เพราะเลือดอาจไหล ไม่หยุด
4. เมื่อไปพบทันตแพทย์หรือแพทย์อื่นๆ ต้องแจ้งให้ทราบว่ากำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องผ่าตัด หรือถอนฟัน

กลไกการออกฤทธิ์

เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants; NOACs) มีผลทำให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง ออกฤทธิ์ยับยั้ง Factor Xa ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว

ขนาดยา

ผู้ใหญ่:

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า

ผู้ป่วยภาวะไตทำงานบกพร่อง:

CrCl 15-50 mL/min : 30 mg/วันละครั้ง

CrCl < 15 mL/min : not recommended

ข้อควรระวังในหญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร

หญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร
ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากข้อมูลที่ศึกษามีไม่เพียงพอ

จลาจยา

ชื่อยา เอ็ดด็อกซาแบน 60 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
หลังอาหารเช้า
Preg cat. C
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

เอกสารอ้างอิง

1. Lexicomp. Edoxaban: Drug information [Internet]. 2022 [cited 2023, June 20]. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Available from: <https://www.uptodate.com/contents/edoxaban-drug-information>

2. Medscape. Edoxaban: Drug information [Internet]. 2022 [cited 2022, June 21]. Medscape WebmedMD Inc. Available from: <https://reference.medscape.com/drug/savaysa-edoxaban-999979>